

Circular From NORTH

Date: 27 March 2018

避免巴西黄热病

黄热病病毒通过雌蚊叮咬来传播，且在热带地区流行。巴西目前暴发的是森林型(丛林型)黄热病。巴西当地通代，Proinde P&I 发布通函详述病毒特性及如何避免感染。

典型的症状在潜伏3到6天后出现，包括发热、肌肉痛、剧烈头痛、冷颤、食欲不振和恶心。据报告，约有15%的病人进入毒性更强的感染阶段，症状包括高烧、黄疸、腹痛并伴有呕吐，半数进入更严重感染阶段的患者，在几周内死亡。

接种疫苗是能够抵抗黄热病病毒的唯一适当防御。世界卫生组织建议所有去巴西的旅游者接种黄热病疫苗。

Proinde P&I 发布可采取的额外积极措施，从而降低被蚊子叮咬的风险。包括，

- 呆在有屏蔽或有空调的房间并关闭门窗。
- 如果未在空调房间，应在百灭宁处理过的蚊帐内睡觉。
- 理想的是，穿着浅色的百灭宁处理过的长袖长裤，尽可能全副武装。
- 使用合适的杀虫剂，按照产品标签上的指示用在暴露的皮肤和衣服上。
- 发现黄热病症状，立即寻求治疗，可抑制感染发展。

全文可在[这里](#)阅读

北英保赔协会之前报道过中国对来自黄热病暴发区域船舶的要求。

可点击链接阅读: [/insights/industry-news/china-yellow-fever-requirements/](#)

信息来源: North of England P&I Club